

이것이 궁금해요!

Q 만성질환이 있는 경우 오셀타미비르 투여는 어떻게 하나요?


A 만성질환 환자도 오셀타미비르를 복용할 수 있으나, 의사에게 미리 알려야 합니다. 신기능 저하 환자는 투여 용량 조절이 필요합니다. 복용한 사람에서 간 효소치의 상승이 나타날 수 있으므로 간질환 환자의 경우 의사와 상의하여야 합니다. 당뇨 환자의 경우 고혈당증이 보고된 바 있으므로 주의가 필요합니다.

Q 오셀타미비르를 복용하더라도 증상이 계속되는 경우는 어떻게 하나요?

A 다른 원인이 있을 수 있으므로 의사와 상담해야 합니다.

Q 오셀타미비르 복용을 잊었을 때는 어떻게 하나요?

A 제 시간에 약을 복용하지 못한 경우 다음 복용 시간이 2시간 이상 남았으면 가능한 빨리 누락된 용량을 복용하여야 하며, 이후 일정 시간에 복용해야 합니다.







식품의약품안전처 온라인 의약도서관
(<http://drug.mfds.go.kr>)에서
상세 의약품 정보를 확인할 수 있습니다.

의약품 부작용이 발생하면?

의약품을 복용한 후 부작용이 의심되면 의사 또는 약사와 상담한 후 한국의약품안전관리원으로 보고해주세요. 국민 여러분의 보고자료는 부작용 예방대책을 마련하는 밑거름이 됩니다.



의약품 부작용 보고 방법은?


-  1644-6223(평일 9:00 ~ 17:00)
(팩스 02-2172-6702)
-  홈페이지 : <http://www.drugsafe.or.kr>
-  이메일 : kids_qna@drugsafe.or.kr
-  (14051) 경기도 안양시 동안구 부림로
169번길 30 5층 한국의약품안전관리원

※ 보호자가 대신하여 보고할 수 있습니다.

의약품 부작용
보고 및 피해구제 무료상담
☎1644-6223

인플루엔자 바이러스 치료제 (오셀타미비르 성분제제) 안전사용 길라잡이



 식품의약품안전처

 한국의약품안전관리원

이것이 궁금해요!

Q 오셀타미비르는 어떻게 구입할 수 있나요?

A 오셀타미비르는 전문의약품으로 의사의 처방전이 필요하며 처방전에 따라 약국에서 구입합니다.

Q 오셀타미비르를 백신 대신 사용할 수 있나요?

A 인플루엔자 감염 예방의 일차요법은 백신요법입니다. 이 약은 백신 대신 사용할 수 없습니다. 다만, 그 해에 유행되는 균주에 대한 예방효과를 기대할 수 없거나 백신접종을 하지 못하는 경우에 한하여 고려할 수 있습니다.

Q 오셀타미비르를 해열진통제(이부프로펜, 아세트아미노펜, 아스피린)와 함께 복용해도 될까요?

A 오셀타미비르의 효과에 영향을 미치지 않으므로 함께 복용할 수 있습니다.

Q 오셀타미비르를 임신부나 수유부도 먹어도 되나요?

A 임신부, 수유부 모두 의사와 상의할 것을 권장합니다. 제한적인 연구에서 태아에 대한 위해 작용은 나타나지 않았습니. 또한 모유로의 분비는 보고된 바 있으나 그 양이 적은 것으로 나타났습니다.



오셀타미비르는 어떠한 의약품인가요?

오셀타미비르(Osetamivir)는 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료와 예방에 사용되는 항바이러스제 의약품입니다. 인플루엔자 바이러스 표면의 뉴라미니다제(Neuraminidase) 라는 효소를 억제하여 호흡기에서 인플루엔자 바이러스의 증식을 막습니다.

※ 제품: 타미플루캡슐75밀리그램(인산오셀타미비르) 등 123개 품목 ('17. 8. 21 기준)

오셀타미비르는 어떤 경우 사용하나요?

✓ 치료

출생 후 2주 이상 신생아(수태 후 연령이 36주 미만인 소아에는 적용되지 않음), 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료

✓ 예방

1세 이상의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 예방

※ 예방의 일차요법은 백신요법이므로 이 약은 백신 대신 사용할 수 없습니다.

오셀타미비르는 어떻게 복용하나요?

일반적으로 치료를 위해서는 1일 2회 5일간 복용하며, 예방을 위해서는 1일 1회 10일간 복용합니다. 증상이 나아지더라도 임의로 중단하지 말고 처방일수 만큼 계속 복용합니다.

인플루엔자 바이러스는 감염 후 72시간 내에 증식이 일어납니다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해서는 초기 증상 발현 또는 감염자와 접촉한지 48시간 내에 약을 복용해야 최적의 치료효과를 기대할 수 있습니다.



※ 음식을 섭취와 관계없이 복용할 수 있으나, 음식과 함께 복용하면 이상사례의 가능성을 줄일 수 있습니다.

주의해야 할 사항이 있나요?

소아·청소년의 경우

이 약을 복용중인 인플루엔자 환자들 중 주로 소아·청소년 환자에서 **경련과 섬망**의식상태의 동요와 운동성 흥분이 동반된 상태)과 같은 신경 정신계 이상반응이 나타날 수 있습니다.

그러나 이 약 투여로 인한 것인지는 알려져 있지 않고, 이 약을 복용하지 않았던 환자에서도 유사한 증상이 발현될 수 있습니다.

따라서 보호자는 적어도 2일간 아이가 혼자 있지 않도록 함께 하시고, 이상행동 발현에 대해 면밀히 관찰해야 합니다.

※ 인과관계는 불분명하지만, 10세 이상의 소아 환자에서 이 약의 복용 후 이상행동을 보이거나 추락 등의 사고에 이른 사례가 보고 되었습니다.

어르신의 경우

어르신의 경우 용량조절은 필요하지 않습니다. 하지만 종종 신체적 기능(신기능, 간기능 등)이 감소되고 여러 질병을 앓기 쉬우므로 주의가 필요합니다.

어떤 이상사례가 보고되었나요?

한국의약품안전관리원은 의약품이상사례보고시스템(Korea Adverse Event Reporting System, KAERS)을 통해 의약품 등을 투여·사용 후 발생한 부작용에 대하여 보고를 받고 있습니다.

2012~2016년 5년 간 다빈도로 보고된 오셀타미비르의 이상사례에는 아래와 같은 증상들이 있습니다.



만일 심각한 이상사례가 의심되거나 발생한다면 오셀타미비르 복용 중단 여부를 의사나 약사와 상담하세요.

